

Debridement Hydrogel

Size

15ml
30ml
50ml

Warnings:

- ⚠️ Contact us in case of any complications.
- ⚠️ Sterile if undamaged, unopened Pack.
- ⚠️ Store in a dry and cool place preferably at room temperature.
- ⚠️ Keep away from sunlight or excessive moisture.
- ⚠️ If you experience any allergic reactions, discontinue use of the product, immediately contact your healthcare professional.
- ⚠️ Disposal: This product should be disposed based on the hospital or healthcare professional advice. (According to local regulations and procedures)
- ⚠️ For external use only on skin wounds.
- ⚠️ Do not use for infusion or injection.
- ⚠️ Do not ingest.
- ⚠️ Use with secondary dressing to prevent evaporation of water content.
- ⚠️ The maximum time to replace the product is 72 hours and the maximum duration of use is less than 30 days.
- ⚠️ Do not use the product if there is evidence of packaging damage or after the expiration date.
- ⚠️ This product meets the requirements of ISO10993.
- ⚠️ Debrogel is a sterile and single-use product and should not be re-used.

Indications (intended purpose):

The Wound Gel is intended to cleanse and moisten different type of dry wounds including:

- Uninfected dry wounds
- Pressure ulcers
- First and second-degree burns
- Partial and full thickness wounds
- Surgical wounds
- Diabetic ulcers
- Donor sites and grafts
- Vascular ulcers

Contraindications:

- Allergic reaction

Directions for Use

1. Wash the wound and the surrounding area. (Exidal can be used for this purpose.)
2. Apply sufficient amount of hydrogel on wound. (Regarding to size and situation of wound)
3. Apply second dressing like gauze.

How to remove

1. The gel can be removed from the wound by rinsing with sterile normal saline solution.
2. the frequency of dressing changes depends on the clinical condition of the wound and the amount of exudate produced. Change the wound dressing as directed by a healthcare professional.

Intended Users (target users)

Healthcare professionals and technicians in the field of wound care and healing

Target population

Adults (excluding pregnant)

Target location (application site in the body)

In direct contact with patients’ breached skin

Intended environment and place of use

This product has no restriction or limitation for place of use.

Side Effects

In the case of irritation, discontinue use of product.

size and catalogue number:

15ml	30ml	50ml
DG/01/01	DG/02/01	DG/03/01

Symbols

	Manufacturer		Do not re-sterilize
	Date of manufacture		Do not re-use
	Use-by date		Consult instructions for use
	Lot Code		Do not use if package is damaged
	Catalogue number		Keep dry
	Sterilized using radiation		Keep away from sunlight
	Upper limit of temperature		

 **Manufactured by: Nano Fanavaran Narin Teb**
No. 1462, Pharmaceutical Incubator Center of Tehran University of Medical Sciences, North Kargar Street, Tehran, Iran

Please report any adverse events related to this product to the email address of Nano Fanavaran Narin Teb (info@nanonarin.com) or the General Department of Medical Equipment of Iran.

Please contact Nano Narin Teb patient support for further information and directions.
Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com

پانسمان هیدروژل دبریدکننده زخم

حجم

15ml

30ml

50ml

هشدارها و ملاحظات قبل از مصرف پانسمان

- △ در صورت بروز هرگونه عارضه ای با ما تماس بگیرید.
- △ در صورت عدم آسیب دیدگی بسته بندی، استریل است.
- △ محصول در مکانی خشک و خنک، ترجیحاً در دمای اتاق نگهداری شود.
- △ از قرار دادن پانسمان در مقابل نور خورشید یا رطوبت بیش از حد خودداری کنید.
- △ در صورت بروز هرگونه واکنش آلرژیک ، استفاده از محصول را قطع کرده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید.
- △ روش امحاء: محصول را در دو کیسه پلاستیکی در بسته قرار دهید و به سطل زباله بیندازید.
- △ فقط برای استفاده خارجی بر روی زخم‌های پوستی.
- △ برای تزریق یا انفوزیون استفاده نشود.
- △ خورده نشود.
- △ از پانسمان ثانویه برای جلوگیری از تبخیر محتوای آب استفاده کنید.
- △ حداکثر زمان تعویض محصول 72 ساعت و حداکثر مدت زمان استفاده کمتر از 30 روز می باشد.
- △ در صورت وجود شواهد مبنی بر آسیب دیدگی یا منقضی شدن محصول از آن استفاده ننمایید.
- △ این محصول، تمامی الزامات استاندارد ISO10933 را با موفقیت گذرانده است.
- △ ژل دبریدمان، یک محصول استریل شده و یکبار مصرف است و نباید مجدداً استفاده شود.

موارد مصرف

ژل زخم برای پاکسازی و مرطوب کردن انواع زخم‌های خشک، از جمله موارد زیر طراحی شده است:

- زخم‌های خشک غیرعفونی
- زخم‌های فشاری
- سوختگی‌های درجه یک و دو
- زخم‌های سطحی و عمقی
- زخم‌های جراحی
- زخم‌های دیابتی
- نواحی اهداکننده پوست و پیوندها
- زخم‌های عروقی

موارد منع مصرف:

- واکنش آلرژیک

دستورالعمل استفاده

1. زخم و ناحیه اطراف آن را شستشو دهید. (می‌توان از اکسیدال برای این منظور استفاده کرد)
2. مقدار کافی از هیدروژل را بر روی زخم بمالید. (با توجه به اندازه و وضعیت زخم)
3. از پانسمان ثانویه مانند گاز استریل استفاده کنید.

نحوه برداشتن

1. ژل را می‌توان با شستشو یا محلول استریل نرمال سالیین از روی زخم پاک کرد.
 2. تعداد دفعات تعویض پانسمان به وضعیت بالینی زخم و میزان ترشحات تولید شده بستگی دارد.
- پانسمان زخم را طبق دستور پزشک یا درمانگر تعویض کنید.

کاربران

متخصصین و درمانگران حوزه درمان و مراقبت از زخم

جامعه هدف

بزرگسالان (بجز خانم‌های باردار)

عوارض جانبی

در صورت ایجاد تحریک موضعی، استفاده از محصول را متوقف کنید.

-لطفاً هر حادثه ناگوار مرتبط با این محصول را به آدرس ایمیل شرکت نانو فناوران نارین طب (info@nanonarin.com) و یا اداره کل تجهیزات پزشکی ایران گزارش دهید.

تولید شده توسط: نانو فناوران نارین طب

ایران، تهران، کارگر شمالی، مرکز رشد فناوری دارویی، پلاک 1462

- جهت کسب اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی بیمار شرکت نانو نارین طب تماس بگیرید.

Tel: +9821-91076061, www.nanonarin.com, info@nanonarin.com